



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Publication périodique

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN N° 169 -

19 décembre 1988

ABONNEMENT 1989

Réabonnez-vous rapidement en nous retournant le
formulaire joint accompagné de votre règlement. Merci.

PEPINIERE DE TOMATES

Un très bon état sanitaire de la pépinière est une assurance pour l'avenir
de la culture de tomates. Pour l'obtenir :

- Intervenez dès l'apparition des aleurodes :

- en lutte biologique, 1er lâcher d'*Encarsia*
- en lutte chimique, traitement avec Isathrine, Resbuthrin ...

Pour déceler les premiers adultes, il suffit de poser quelques
plaquettes jaunes engluées (10 X 10 cm) près des portes, du chauffage.

- Guettez les premières galeries de mineuses pour effectuer très tôt un apport
d'auxiliaires (*Dacnusa*, *Diglyphus*).

- Faites une application de Pirimor ou Hostaquick. Elle permet généralement à la
culture d'être indemne de pucerons pendant plusieurs mois. Ce traitement ne devra
pas être proche d'un lâcher d'auxiliaires.

- Prévoyez un traitement contre le *Botrytis* avec un produit à base de thirame.

P50

SERRE

Avant plantation, procédez à un nettoyage très soigné de la serre, en suivant les indications données dans le dernier bulletin (n° 168 du 30 novembre). On observe que les serres où l'on rencontre des problèmes sont souvent celles où le nettoyage n'a pas été pratiqué d'une manière satisfaisante.

Remarque : Le Lannate est déconseillé pour détruire les aleurodes dans la serre et sur jeunes plants. Il semble gêner, peut être par sa rémanence, la bonne implantation des Encarsia.

Aussitôt après plantation, faites un apport d'Encarsia.

LAITUES

Evitez les arrosages en période d'humidité prolongée. Faites-les par matinées ensoleillées.

Aérez pour réduire l'humidité. Réglez le chauffage pour éviter le gel.

Protégez régulièrement les laitues contre Mildiou, Botrytis et Sclerotinia.

Pour éviter des risques de résidus de mancozèbe (Dithiocarbamates) à la récolte, il est conseillé d'utiliser contre le Mildiou des spécialités où ce produit est associé à d'autres matières actives : Pulsan, Rhodax, Fulvax, Rémitline. Les quantités de mancozèbe appliquées sont ainsi plus faibles.